

使用上の注意改訂のお知らせ

## オロナインH軟膏・オロナイン液 (クロルヘキシジングルコン酸塩を含む製品)

平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚くお礼申し上げます。  
このたび、弊社「クロルヘキシジングルコン酸塩含有 外用剤」の使用上の注意を改訂しますので、ご連絡申し上げます。

つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、使用に際してご不明な点がございましたら、弊社お客様相談窓口までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

弊社お客様相談窓口：☎03(3293)3212 / 受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

### 1. 該当製品

#### オロナインH軟膏、オロナイン液\*

\*：オロナイン液は販売を終了しております。お手元にごございます場合は、今後のご使用に際し、以下の改訂内容をご参照ください。

### 2. 使用上の注意改訂内容

\*オロナイン液には                      の記載はありません。

改訂後(追記)	← 改訂前												
<p> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">してはいけないこと</span></p> <p>(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <p>1.次の人は使用しないでください。 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2.次の部位には使用しないでください。 (1)湿疹(ただれ、かぶれ) (2)化粧下 (3)虫さされ</p> <p> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">相談すること</span></p> <p>1.(略) 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">関係部位</th> <th style="width: 85%;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮 膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">症状の名称</th> <th style="width: 80%;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ショック (アナフィラキシー)</td> <td>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.(略)</p>	関係部位	症 状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ	症状の名称	症 状	ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。	<p> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">してはいけないこと</span></p> <p>(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <p>次の部位には使用しないでください。 (1)湿疹(ただれ、かぶれ) (2)化粧下 (3)虫さされ</p> <p> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">相談すること</span></p> <p>1.(略) 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">関係部位</th> <th style="width: 85%;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮 膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.(略)</p>	関係部位	症 状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ
関係部位	症 状												
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ												
症状の名称	症 状												
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。												
関係部位	症 状												
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ												